



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASERADA SUL PIAVE

VIA dello Stadio n°3 •CAP 31052 Maserada sul Piave (TV) •TEL. 0422/778028 •CODICE: TVIC85700G •C.F. 94105490265  
PEC: [TVIC85700G@pec.istruzione.it](mailto:TVIC85700G@pec.istruzione.it) •E- mail: [TVIC85700G@istruzione.it](mailto:TVIC85700G@istruzione.it) •SITO ISTITUZIONALE: [www.icmaserada.edu.it](http://www.icmaserada.edu.it)



ECDL  
European Computer  
Driving Licence



CIR. N.163 GENITORI

CIRC. N. 263 DOCENTI/ATA

Ai genitori  
Al personale docente e ATA  
Scuola dell'Infanzia di Candelù

Al Dipartimento malattie infettive  
AULSS 2 Veneto

Al Sindaco del Comune di Maserada sul Piave

### **OGGETTO: SEGNALAZIONE ULTERIORI CASI DI SCARLATTINA E STREPTOCOCCO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CANDELU'**

Con la presente si comunica ai genitori, al personale e alle autorità in indirizzo che a tutt'oggi continuano ad emergere ulteriori casi di scarlattina e streptococco tra gli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia di Candelù.

In attesa di ricevere eventuali ulteriori indicazioni per la gestione degli stessi, si ricordano al personale le seguenti raccomandazioni:

- costante areazione dei locali scolastici;
- disinfezione delle superfici e degli oggetti;
- corretta igiene delle mani al momento di consumare merende o pasti.
- 

La Scarlattina è una malattia causata da un batterio, lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A, produttore di tossina. I sintomi compaiono all'improvviso con febbre, mal di gola, faringite; nei casi più gravi può comparire febbre elevata, nausea e vomito.

Dopo circa 12-48 ore compare il tipico esantema (che svanisce alla pressione), puntiforme, apprezzabile al tatto (tipo carta vetrata) e caratteristica colorazione a fragola della lingua.

Le complicanze possibili sono l'otite, l'ascesso tonsillare e, in via eccezionale, la glomerulonefrite e la malattia reumatica.

Con una certa frequenza l'infezione da Streptococco Beta-emolitico di Gruppo A si presenta come una faringotonsillite, oppure senza sintomi di malattia: si parla in questo ultimo caso di portatore sano dello Streptococco; lo stato di portatore può durare anche per lungo tempo, ma con minima contagiosità.

#### Trasmissione:

per via aerea attraverso goccioline respiratorie di ammalati o portatori.

#### Incubazione:

**Firmato digitalmente da DANIELA BILGINI**

1-3 giorni, raramente più lungo.

Contagiosità:

dalla comparsa della malattia e per tutta la sua durata. La contagiosità si interrompe dopo 24-48 ore dall'inizio di adeguata terapia antibiotica.

Rischio di diffusione nella scuola:

medio.

Azioni preventive: la diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del caso.

**COME INTERVIENE IL SERVIZIO SANITARIO**

Provvedimenti nei confronti del malato: allontanamento dalla frequenza scolastica almeno fino a 48 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica. Questo trattamento riguarda anche altri bambini con faringotonsilliti streptococciche. Nessun trattamento è previsto per i portatori sani di Streptococco.

Provvedimenti nei confronti dei conviventi e dei contatti: sorveglianza sanitaria per 7 giorni. La profilassi antibiotica e l'esecuzione del tampone faringeo di norma non sono indicati.

Maserada sul Piave, 18/04/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Daniela BILGINI

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa*